

שבע וארץ

חוּבָּרֶת ב' (כרך ה')

נובמבר 1962

חשוון תשכ"ג

חובן העניינים

58	נופי הגליל העליון במקרא — מנחם זהרוני
62	טופצת זרעים וניביטתם — דב קולר
	המשלחת הישראלית לחקר דרום ים-סוף — לב פישלזון
68	על החיים במצולות ים — יואל לוי
75	70 שנה למסילות-ברזל בארץ ישראל — שמואל אביצור
83	התאנה התרבותית — אליעזר שמאי
88	הנקר הסורי בארץנו — יגאל סלע
93	תצלויות בנקר — אורנה ואילן אוקו
95	מהו "ספל אדריכים"? — יריב שפירא
98	500 שנה לקילומטר — שמואל בונגים
102	בשער ספרים
104	תכניות ופעולות

התמונה שבשער: הנקר משקוף על העולם מתוך קנו;
ראה את הרשומות על הנקר, בעמ' 93.

העורך:

ג. תבז'ינו

חברי המערכת:

ש. אביצור, ח. בר-עמרם

יוצא לאור ע"י הוצאה "ספרית השדה" (הסתדרות הפעלים החקלאיים בישראל)

בשיתוף עם המרכז לתרבות ולחינוך ותנועת החוגים לדיעת הארץ, של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל,

והאגף לחינוך חקלאי במשרד החינוך והתרבות.

הכתבות:
טבע וארץ", "ספרית השדה",
תל-אביב, ת. ד. 4,
רח' לילינבלום 25,
טלפון 57868
מס' הח' בנק הדואר 4590

TEVA WA'AREZ
(Nature and Country)

Monthly

Editor: N. Teradyon
Tel Aviv, P. O. B. 4, Israel

November 1962
No. 2 Vol. 5

מאמריהם ומכתביהם למדור ידיעת הארץ, יש להפנות לש. אביגדור, המרכז לתרבות ולחינוך, הווע'פ של ההסתדרות, דוח ארלווזרוב, 93, תל-אביב.

מחיר חובי בחדת 95 אב'.
חוּבָּרֶת כפולת — 1.90 ל"י.
דמי חתימה לשנה — 8 ל"י.

הנקר הסורי בארץנו

אנו מוצאים לנוין לפרסם את שתי הרשימות הבאות על הנקר, אשר אם כי הוא נצטווינו איננו כלל חדש בארץ (טריטוריאם דאהו לפני פנוי מה שנים גם בגליל התיכון), גם בשומרון וגם בהרי חברון), הנהו הוא בcheinת חדש בתודעה חובבי הטבע וכמושא לתצפיותיהם. לא כל הפרטיס מתאימים בשתי הרשימות. למשל, בתצפית בגען נראה רק הזכר בונה את הקן, ואמננס העבודה נמשכה יותר זמן. אנו מפרסמים את הרשימות בתקווה שהשתכלויות בעז נאה ומונין זה ירבו, ובשנים הבאות אפשר יהיה לתקן ולהוסיף על הידענות המובאות בהן.

יגאל סלע

הנקר

לפי שני סימנים: א) הקול אמן אינו עשיר בגוניות אך הוא חזק מאד. גם קול הניקור נשמע למרחוק, בעיקר בעונת הקינון. ב) תעופת הנקרים בשטח

הנקר הסורי (הוא עוף יער מובהק, וכל חיו תליים בעץ. התכונות העיקריות המסללות אותו לחיים על העץ הן: המקור עשוי לעקירה בעץ. הוא חזק מאוד, ובסיסו רחב. קצחו עשוי כמפלטה, וצורת חיבورو לגולגולת מקטירנה את החזועים הכרוכים בנקירה).

הלשונו עשויה להדרור אל תוך מהירות הרמשים מהם הוא ניזון. היא ארוכה, דביקה ומשוננת ושניה פונוט אחורה. עצמות הלשון ארוכות מאוד, ומוגירות עד לעיניים. לשונו השלופה של הנקר ארוכה כמחצית גופה.

הזנב עשוי לתמוך את הגוף בעזר שלרגליים (בדומה לנגב הקנגורו). עצם הזנב רחבת מאד וחזקה. תוכנה מיוחדת של נוצות הזנב היא שהקנה קשה לכל אורכו, ולפיכך אין נשרות בנקר.

לרגליים 4 אצבעות ארוכות, ש-2 מהן מופנות לפנים, ו-2 לאחרו. ה ציפורניים ארוכות וחזקות, ומשמשות כמכשור טיפוס מצוינים, הנחוצים גם בשטחים חלקיים.

צבעו היסודי של הנקר שחור מוכתם לבן, תחתו נגב אדום. המינים שונים מים, אך לזכר גם קדרון אדום. גודל הנקר בגודל הזרזיר.

קל להוות את הנקרים במקומות חיותם



צייר בשבייל "טבע וארץ" — פרופ' ה' מנדרסון

(1) *Dryobates syriacus*

מקבילים לפני הקרקע, אלא שהצורה והגודל של קנים נאלה שונים מן הרגיל. בניתן הcken נמשכת כ- 4 ימים, ושני בניי הוג משתפים בה חליפות; הפנו משגיח בגעשה מקרבת מקום, ומקיים קשר קריאות רצוף עם בן זוגו העובד. לכן כניסה צרה, כדי 4.5 ס"מ. העולה בקשת קלה כלפי מעלה, ובמרכו העץ הוא מתרחב ופונה כלפי מטה. רוחבי בו של הcken אין עולה על 20 ס"מ. ואורכו מן הפתח עד לתחתית כ- 40 ס"מ. נקירתן אין כה גדול ממשך כ- 4 ימים. הרוי זה הספק עבודה עצום, וכן העבודה נעשית בחירותיו, בלי הרף, ובקצב נרץ. כ- 8 הקשות מקור בשנייה. הcken כמו כן שוד לגMRI, ומרופד בשירוי העצה. בשל עומקו הרב של הcken, הנקרים הנכסיים לתוכו יורדים על הדופן בריגלים.

ראשם מופנה כלפי מטה. הנקרים מגדלים ברכיה אחת בשנה. הנקבה מתילה 3 ביצים לבנות, סגולות. רוב ההטילות נשמו ממשח חדש אפריל, ממשח הדירה כ- 16 ימים. מרבית הזמן יושבת הנקבה על הביצים, והזכר מתופף בעצים השכנים.

הגוזלים בוקעים בבת אחת (מכאן שם הדירה מתחילה עם הטלת הביצה האחת רונה) כשהם ערומים לגMRI ועורם שקו. בסות הנוצות של העצירים דומה להוררים. אלא שלא שלהם יש גם כתם אדום במצחם.

מזון הנקרים כולל חסרי חוליות שויים, וגם שקדמים. אופן פיצוח השקדמים מעניין מאוד. הנקר מעביר את השקד אל גוץ או ענף חזק, ומניחו בתוך חור או חריץ בעץ. כבча מונח השקד על סדן מתאים, והנקר מקיש עליו במקומו ומאפשר. אם אין הנקר מוצא בקרבת מקום חור או חריץ מחאים להנחת השקד, הרינו קווד במחירות חור מיוחד לנken, ומניה בו את השקד. המזון נאסר מכל

פתח גלית, כמו של ציפוריה-השיר, אך הם ניכרים מיד באורכם הבלתי רגיל.

הנקרים יציבים, וח חיים כל השנה בזוגות, בתחום מתחה נורתי בים, המצויצים בתקרכב האביב. שטח תחום-המחיה הוא פונקציה של סוג העצים באותו מקום, ושל כמות המזינים שביהם. במתוך זיתים יהיו תמיד תחומי המחייה נרחבים יותר מבקרים חרובים, אפילו הזיתים צפופים יותר, כי החרוב נגוע על פי רוב במזינים יותר מהזית. לא יפלא אפוא שמצויצים הבדלים ניכרים בגודל תחום המחייה של זוגות שונים, מכמה עשרות דונם ועד מאות דונם מים לוג אחד.

התקרבות עונת הקינון ניכרת בפערilot מוגברת, בקריאות רמות מעץ לעץ ובתקשה נמרצת של הזכר בעצים. הקשת המקור בעצים מלאת תפקיד גם בראואה וגם בחיפוש מקום מתחאים לנken. בתחילת עבור הזכר מעץ לעץ, בלי לצא את מותו השמיעה של הנקבה, ומשיש במקומות החלולים או חלולים למחזה.ليل ההקשת אפשר לוג לחזור את העץ הרצוי לקין. כשבנמצא עץ כזה, עומד הזכר ומתויר אף עליו שעות ורכות, ורק לאחר מכן ניגשים לבניית הcken.

הנקרים מקננים בעצים שונים: חרוב, זית, אלון-התבור, אקליפטוס ועוד. דרכת. רום הcken מעל לקרקע עשויה להיות פחות משלני מטרים, ועד 5 מ', והcken נשי כף אל חלקה פגודה עצים. הגזע או הענף הנבחר לקינון, עוביו לפחות 20 ס"מ, והוא מוגן מפני חידרת מי הגוף. פנים העץ הנבחר על פי רוב כמעט אך לא חלול ממש, ומבחן הוא שלם לגMRI. מתאים ביותר לקינון האוזן דרכת והחרוב, ובעצים האחרים שי נזכיר לעיל מוצאים קנים רק לעיתים נדירות. ראוי לציין כי הcken לא תמיד מאונך, אלא מוצאים קנים גם בענפים

ובשאלת מזון על כל שריטה בעץ או על כל קול אחר. בתגובה זו הם שווים מאוד מגוונים אחרים, הדומים במשמעותם קול זה.

גידול הצעאים מסתימים תוך ימים ספורים מיום יציאת הצעירים מן הקן. הצעירים מתפזרים וה מבוגרים חוזרים לשוטט כזוג, בתחום המניה הנרחב, עד לעונת הקינון הבאה.

תפוצתו של הנקר בארץ מקיפה לפחות את כל החבל הים תיכוני, והיא מותנית במצבות חברת עצים מתאימה לו. עד כה נודע על קיומו בכל רחבי הגליל, פרט למורדות המזרחיים, בכרמל, בגלבוע, בהרי ירושלים ובבתי-גוברין, בשפלת החוף וועוד. פעמי אחת נראה פרט ועוד בכפר דופין.

אם לא נביא בחשbon שתחום הגטוועים בידי אדם, נוכל לומר כי הנקר קשור לנוף יער פתוח, כגון חברת החרוב, ואלונן-התבור, ובעיקר החרוב; וזאת מפני שעצים אלו נוחים יותר מעץ חיים ים-תיכוניים אחרים מבחינה האפ-שרוויות לקינון ולמציאות מזון.

הנקר נזון ברמשים המזוקים לעצים. והוא אפוא עוף מעיל. יתרון כי אפשר להרחיב את תפוצתו לטובות המטעים על ידי נתיעת עצים מתאימים לו בתחוםם.

חלקי העץ, עד קרוב לקרקע, הנker אינו יורד לעולם לקרקע. הנker אינו משתחמת מזון בעץ אחד, עובר ה- הנker להיוון בעץ אחר. מעניין כי צדיכת המזון המוגברת של הצעירים בתגובהם אינה גורמת בקוריים חכופים יותר של ההורם בקן, אלא נשיאת כמות גדולה יותר של מזון בכל ביקור. בעונת האביב לה מתרופפת השגחתם של הנקרים על גבולות חום המניה הנרחב, והם שומי-

רים רק על תחום מצומצם. הנקרים נהנים מביתחון רב יחסית בקינונם. לזאת אפשר להיות את הסתפ' קותם בגידול בריכת אחת קטנה, ואת התנהגותם בקן וסביבו. בעוד שברוב ימות השנה קשה מאד להתקרב אליהם, הנה בעונת האכלתם אפשר להתקרב אל המבוגרים עד כדי הסתכלות נוחה בעין בלתי מזונית. גם שינויים יסודיים החר לים סביב הkan ואפילו בקן עצמו, פרט לפתח, אינם מרתיעים אותם מליהיכנס לתוכו תוך דקota ספורות. אך שינוי כלשהו בפתח מפחיד אותם מאוד, עד כדי שהייה במשך שעות מבלי להיכנס פנימה. ואולם פעם אחת פתחנו לנסיוןفتح נסף לאחר, גدول הרבה יותר, וההורם בחרו בו מיד וונחו את הפתח המקרי. גם הגוזלים אינם רגושים ביותר; גם בסוף התפתחותם הם מגיבים בתתרומות