תרגיל 3

1. מהן הנקודות עם תכונת ליפשיץ?
(נקודת סגירה כל נקודה שאינה הנקודה)
$\ln((x-5)^2+1)$, $\sqrt{x(x-1)}$, $|x+\operatorname{tg}x|$, $\sqrt[3]{1-x^2}$

2. מהן הנקודות (מערכות משוואות דיפרנציאליות) שאקוויוולנטיות (נקודת קיום ויחידות) (אינה הנקודה)

$y'=y^2+\cos y$, $y'=\sqrt{x}\cdot y$, $y'=y^{\frac{2}{3}}$,

$\begin{cases}\dot{y}_1=\ln(y_1+y_2)\\ \dot{y}_2=y_1^{\frac{1}{3}}|y_2|\end{cases}$, $\begin{cases}\dot{y}_1=|t|y_1+y_2^{\frac{2}{3}}\\ \dot{y}_2=t^{\frac{2}{3}}y_1\end{cases}$, $\begin{cases}\dot{y}_1=\sqrt{y_1+y_2}\cdot\operatorname{tg}t\\ \dot{y}_2=y_1^2t-y_2\operatorname{tg}t\end{cases}$,

3. לפתרון בע"י קיום. (פונקציה)

$\begin{cases}y''=(y')^2-1+y-x\\ y(1)=1\ ,\ y'(1)=1\end{cases}$, $\begin{cases}\ddot{y}+\operatorname{arctg}t\cdot\dot{y}+\sin t\cdot y=0\\ y(0)=0,\ \dot{y}(0)=0\end{cases}$

4. מצא נקודות (שבהן) ליניארי בסביבה $0\approx\varepsilon$ בנקודה $t=0$ כפונקציה של ε.

$\begin{cases}\dot{y}=\sin t\sin y+\sin 2t\sin 2y\\ y(0)=\sin\varepsilon\end{cases}$,

$\begin{cases}\dot{y}=\sin(y-1+\varepsilon)+\sin\varepsilon\\ y(0)=1+\varepsilon\end{cases}$.